

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 28-4-72 307160

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

34 MONTPELLIER

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 francs
N° I39 - AVRIL 1972
4° supplément

STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS
VITICOLES

Montpellier le 25 avril 1972

Ecole Nationale Supérieure Agronomique
de MONTPELLIER

NOTE : 3

MILDIOU

Des taches primaires de mildiou ont été découvertes dans la plaine de Beaucaire le 22 avril sur des vignes désherbées chimiquement, portant près du sol des sarments non taillés.

D'autres taches ont été trouvées le 24 sur des feuilles provenant de sarments tronçonnés, formant boutures et enfouis partiellement par le passage du rotavator au printemps dernier.

En conséquence, il convient :

- 1°) de supprimer d'urgence toutes les repousses inutiles situées près du sol;
- 2°) de hâter l'exécution du traitement devenu indispensable partout où les pluies ont été importantes et où les grappes sont bien apparentes.

Le Directeur de la Station Régionale
d'Avvertissements Viticoles,

G. BERNON

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Tirage du 25 avril 1972 - 2650 exemplaires
Précédent tirage n° I39 (21 avril 1972) 3° supplément

ABRICOTIER

Les récentes précipitations favorisent de nouvelles contaminations du Monilia partout où l'élagage des productions malades n'a pas été exécuté; l'Oïdium et la Rouille rencontrent des conditions favorables soit à leur extension soit à leur installation; en conséquence un traitement anticryptogamique s'impose : choisir un fongicide polyvalent ou associer des fongicides spécifiques après s'être assuré de leur compatibilité.

PECHER

Les risques de développement du Monilia sont de nouveau importants; d'autre part à la suite de l'hiver doux que nous avons connu le Fusicoccum se développe. Il importe, dans les vergers où ces maladies ont été constatées, de traiter immédiatement.

L.L. TROUILLON

POMMIER

TAVELURE - OIDIUM - ACARIENS -

Les récentes précipitations ont provoqué de nombreuses projections d'ascospores de Tavelure et des contaminations importantes se sont produites dans les vergers mal protégés. Ces précipitations ont lessivé les derniers traitements. Il est donc nécessaire de renouveler la protection contre ce parasite. Il convient de choisir un fongicide réputé comme ne provoquant pas de rugosité et ne favorisant pas le développement des acariens, dans la mesure du possible.

La lutte contre l'Oïdium doit se poursuivre. Rappelons que les Soufres utilisés en poudrage ont l'avantage de freiner le développement des acariens.

Les oeufs d'été d'araignées rouges (Panonychus ulmi) sont déposés depuis quinze jours. Donc il faudrait pulvériser un acaricide adulticide et ovicide. Cette pulvérisation est nécessaire que si la population de ce déprédateur est importante : 5 à 10 formes mobiles par feuille adulte.

POIRIER

Le traitement Tavelure sera également réalisé sur poirier.

M. BEZUT